

Prescription médicale



prenato
spécialiste en dépistage
génétique prénatal

Nom _____

DDN _____

Dépistage Prenato - marqueurs sériques

Calcul de risque basé sur 4 marqueurs sériques (PAPP-A, BHCG, PLGF, AFP), des facteurs maternels et des mesures échographiques. Dépistage des principales trisomies par ADN foetal si risque $\geq 1/2500$ pour la trisomie 21 ou $\geq 1/100$ pour la trisomie 18. Une mesure de clarté nucale est nécessaire pour l'obtention des résultats.

Échographie de clarté nucale

Dépistage Prenato - ADN foetal

Dépistage des trisomies 13, 18 et 21 incluant sexe foetal (en option)

Options supplémentaires 

Anomalies chromosomes sexuels (MX, XXY, XYY, XXX)

Dépistage de la trisomie sur les 23 paires de chromosomes

Dépistage des microdélétions (22q11.2 deletion (DiGeorge), 15q11.2 (Angelman/Prader-Willi), 1p36 deletion, 4p- (Wolf-Hirschhorn), Monosomie 5p.

Dépistage Prenato de la prééclampsie

Calcul de risque basé sur des marqueurs sériques, maternels ainsi que des mesures échographiques. L'échographie du premier trimestre (clarté nucale) doit être effectuée chez Prenato afin d'établir le calcul de risque.

Échographies obstétricales

VIABILITÉ (Raison : _____)

DATATION (à partir de la 7^e semaine d'aménorrhée)

1^{er} TRIMESTRE (datation, clarté nucale, morphologie du 1^{er} trimestre)

2^e TRIMESTRE

3^e TRIMESTRE

AUTRE : _____

SIGNATURE _____

NO. PRATIQUE _____ DATE _____